


みほ倶楽部

平成15年2月
創刊



落葉焚き

焚火だ
焚火だ


山茶花
山茶花
咲いた道



庭の山茶花を加代さんが描き 楠城先生が文を書
きにして添えてくれました。それにつけても近
頃は 焚火の肩身の狭いこと。

ダイオキシン類のうち最も怖い

<四塩化ジベンゾ・パラ・ジオキシン>



*性状は：水に溶けない白色固体。

常温では気体にならず、自然に分解し難い。

*半量に分解されるのには(半減期)：海水中で510日～590日、温室の土壌で160日、
人体は脂肪につきやすく、排出に5～10年、植物の葉の上では、6時間で70%分解
される。

*発生の原因は：・燃焼によって：700℃以下の焼却場・製鉄所・建築廃材等の野焼き・
小型焼却炉・ラップ(ビニリデン)・塩化ビニール以外のプラスチックはほとんど発
生することは無い。

・漂白によって：製紙パルプ工場・クリーニング工場

・製造によって：除草剤・殺菌剤・セメント・ガラス工場、非鉄金属など化学工場。

*どんな物から体に入るか：食物から入る98%、大気中のゴミについて1.5%、皮
膚から吸収することもある。

ダイオキシンより始末が悪い。何事につけても
反対する人たちの声高の大騒ぎ。
宇宙開発・原発・遺伝子操作……。
未知への挑戦 リスクなくしてありえない……。